Diabetes nas Escolas

Gabriela Feiden

Educadora Física

Esp. Gestão em Saúde

Mestranda em Epidemiologia - FAMED/UFRGS

Presidente da AADIRS

Epidemiologia do Diabetes

Incidência de DM1 (0-14 anos/100mil hab/ano) em 2019

3% ao ano

Definição

Grupo de doenças metabólicas caracterizado por hiperglicemia resultante de defeitos na secreção e/ou da ação da insulina

Adaptado de American Diabetes Association - Diabetes Care 2010 Jan; 33(Suppl 1): S62-S69

Diabetes Tipo 1

Ocorre quando o pâncreas não produz insulina, devido a destruição das células Beta. Pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum o diagnóstico na infância e adolescência.

Fatores Ambientais Associados:

- Fatores perinatais: idade materna > 25 anos, pré-eclâmpsia, doença respiratória neonatal, icterícia neonatal;
- Alguns vírus: Coxsackie B (meningites, miocardites, pericardites), Epstein Barr (herpes tp 4), citomegalovirus (herpes simples, herpes genital e do herpes-zóster);
- Dieta: introdução do leite de vaca e cereais em idade > de 4 meses;
- Baixos níveis de vitamina D;

Diagnóstico

Categoria	Glicemia de jejum (mg/dL)	OGTT (mg/dL)	HbA1c
Normal	<100	<140	< 5,7%
Pré diabetes ou risco aumentado para diabetes	≥ 100 e $< 126^*$	≥ 140 e $< 200^\#$	$\geq 5,7$ e $< 6,5$
Diabetes	≥ 126	≥ 200	$\geq 6,5\%$

*glicemia de jejum alterada

#intolerância oral a glicose

**200 mg/dL com sintomas =
DIABETES**

Quadro Clínico

- Aumento da frequência urinária;
- Sede excessiva;
- Fome excessiva;
- Cansaço, fadiga extremo;
- Visão "borrada";
- Cortes/feridas com cicatrização lenta (DM2);
- Candidíase;
- Formigamento, dor ou falta de sensibilidade em mãos/pés (DM2);
- Perda de Peso (DM1, DM2 descompensado);
- Cetoacidose diabética;

Insulina Rápida ou Ultrarrápida - Bolus

Tratamento - insulina lenta / basal

Aplicação da insulina

Canetas
Com dosagem de
0,5u ou 1u

6mm

8mm

12mm

Bomba de Insulina ou
SICI

Aplicação da insulina

Aplicação da insulina

Local	Prós	Contras
Abdomem (evite uma área de 5 cm em torno do umbigo)	Fácil acesso, a insulina é absorvida de forma rápida e consistente	Nenhum
Nádegas e Coxas	Absorção mais lenta do que o abdome e braços	Absorção mais lenta e mais afetada por exercícios
Parte externa do braço	Depois do abdome, o braço é a região que oferece absorção mais rápida	Acesso mais difícil para auto aplicação

Armazenamento

- Insulina fechada deve ser guardada na geladeira entre 2 e 8^aC;
- Insulina em uso não deve ser armazenada na geladeira, exceto quando a temperatura ambiente passar dos 30°C.

Descarte

O descarte inadequado, como no lixo doméstico comum, pode contaminar o meio ambiente e ferir os profissionais responsáveis pela coleta do lixo.

- Manter o recipiente de descarte em local seguro, longe do alcance de crianças e animais.
- Quando o coletor ou o recipiente estiverem quase cheios (2/3 da sua capacidade total), recomenda-se fechá-lo.
- Descartar em um Unidade de Saúde ou em farmácias.

Monitorização

O auto monitoramento da glicemia seja medindo "ponta de dedo" ou com sensor é considerado uma ferramenta importante para o controle do Diabetes.

Monitorização - LIBRE

Acrescenta informações de contagem de carboidrato e quantidade de insulina aplicada

PRESENTE
Leitura de glicose atual

FUTURO
Uma seta de tendência indica para onde a glicose está apontando

PASSADO
Até 8 horas de histórico de leituras

Glicose subindo rapidamente
Superior a 2 mg/dL/minuto

Glicose subindo
Variação por minuto: 1 a 2 mg/dL

Glicose estável
Variação inferior a 1 mg/dL/min

Glicose descendo
Variação por minuto: 1 a 2 mg/dL

Glicose descendo rapidamente
Superior a 2 mg/dL/por minuto

Qual a importância de
saber tudo isso?

Hipoglicemia

Nível 1 (abaixo de 70mg/dL) e nível 2 (abaixo de 54mg/dL) tratar com alimentos ricos em carboidrato de absorção rápida!

15g de carboidratos como: 150ml suco comum ou refrigerante comum ou 1 colher de sopa de açúcar ou 1 colher de sopa de mel ou carboidrato em gel

Nível 2 (abaixo de 54mg/dL) pode ser necessária a ingestão de mais se 15g de carboidratos

Hipoglicemia grave pode causar convulsão e coma!

CRIANÇAS E ADOLESCENTES: a quantidade de carboidrato para a correção da hipoglicemia deve ser ajustada de acordo com o peso, usando 0.3 gramas de carboidratos de ação rápida por kg de peso.

Hipoglicemia

FONTE: KIDS & DIABETES IN SCHOOL – IDF

Hiperglicemia

A hiperglicemia acontece quando há pouca insulina no organismo ou quando o corpo não consegue usá-la apropriadamente. Se a taxa de glicose no sangue estiver acima de 250 mg/dl, é importante checar os níveis de cetonas, no sangue ou na urina. Se houver cetonúria (na urina) ou cetonemia (cetonas no sangue), os exercícios não são recomendados, já que podem levar à descompensação metabólica e fazer a glicose subir ainda mais.

Hiperglicemia

SINTOMAS

MUITA SEDE

MUITA VONTADE
DE FAZER XIXI

IRRITABILIDADE

DORES DE
ESTOMAGO

FONTE: KIDS & DIABETES IN SCHOOL – IDF

Tanto a Hipoglicemia como a Hiperglicemia pode afetar o organismo por um período prolongado

O que é o diabetes tipo 1 (DM1)?

Doença autoimune, ocorre quando o pâncreas não produz insulina, fazendo com que a glicose (açúcar) no sangue aumente.

O que fa

Toda a pessoa com diabetes precisa de monitorização da glicemia e aplicação de insulina nas refeições.

Hipoglicemia

É a glicose menor que 70 mg/dl

Monitorar a glicemia com mais frequência para evitar a hipo!

Pode causar: Suor, visão embaçada, confusão mental, ansiedade, fome, irritabilidade, tremor, fraqueza, dor de cabeça

O que fa

A correção é individualizada e feita com açúcar, mel ou suco.

Após a correção aguarde 15 minutos e verifique a glicemia. Se estiver abaixo de 70 mg/dl repetir o procedimento.

Exercício Físico e atividades extra curricular

O exercício é muito importante no tratamento do diabetes! Se apresentar algum dos sintomas de hipoglicemia ou permanecer em atividade física mais de 45 min, é importante medir a glicemia.

Todos os alunos com diabetes precisam ter o "Kit de Hipoglicemia"

- Aparelho para medir a glicemia;
- Açúcar, mel, bala, suco, para correção rápida - orientação médica e família no item "hipoglicemia";
- Lanche extra;
- Garrafa com água;

Meta para a glicemia (açúcar no sangue): Entre ____mg/dL e ____ mg/dL.

HIPOGLICEMIA (BAIXO AÇÚCAR NO SANGUE):
Se abaixo de 70 mg/dL, por favor, faça o seguinte:

PLANO DE TRATAMENTO DO DIABETES

(A SER PREENCHIDO PELOS PAIS/RESPONSÁVEIS)

Nome do Aluno: _____

Turma: _____

NÚMEROS DE TELEFONES PARA CONTATO:

Hiperglicemia

É a glicose acima de 180 mg/dl

Monitorar a glicemia com mais frequência para evitar a hiper!

Pode causar: Sede, muita vontade de fazer xixi, irritabilidade, dor de estômago,

O que fa

- Beber muita água;
- Medir com mais frequência;
- Aplicar insulina, com orientação médica;
- Se a glicose persistir acima de 180 mg/dl, procurar atendimento médico.

Chame o responsável se a glicemia estiver abaixo de ____mg/dL
(Tel: _____)

HIPERGLICEMIA (ALTO AÇÚCAR NO SANGUE):
Se acima de 180 mg/dL, por favor, faça o seguinte:

Chame o responsável se a glicemia estiver acima de ____mg/dL
(Tel: _____)

Diretrizes das Sociedades Médicas

Contagem de carboidrato

Método para identificar o carboidrato

Método para identificar o carboidrato na porção

Olhômetro

Palma da mão
1 porção de carne

Polegar
30g de queijo

Unha
1 colher de chá de óleo, margarina

Punho (1 xícara)
Arroz ou massa ou 1 batata

Medida Caseira

Colheres

Sopa Sobremesa Chá Café

Escumadeira Concha Colher de servir

Xícara de chá

Copo 200ml

Rótulos

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 200 ml (1 copo)

QUANTIDADE POR PORÇÃO	%VD (*)
VALOR ENERGÉTICO 100 kcal = 419 kJ	5
CARBOIDRATOS, DOS QUAIS:	24 g 8
AÇÚCARES	21 g **
FIBRA ALIMENTAR	2,5 g 10
SÓDIO	23 mg 1
VITAMINA C	14 mg 31

NÃO CONTÉM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS E GORDURAS TRANS.

(*) % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2000 kcal OU 8400 kJ SEUS VALORES DIÁRIOS

Muito comum as pessoas olharem no rótulo "Açúcares", mas está errado! Ao realizar a contagem, se deve levar em consideração "Carboidratos"

Contagem de carboidrato

Para podermos controlar os níveis de glicemia é preciso compreender o que estamos consumindo em cada refeição, pois a glicose se altera de forma diferente com a ingestão de determinados nutrientes.

Fonte: blog sa...

Slide cedido pela nutricionista Renata Rothen

Pacientes e familiares
NÃO podem pirar!
 Temos pelo menos 42
 fatores agindo na
 glicemia

	ALIMENTOS
↑↑	1. Quantidade de carboidratos
→↑	2. Tipo de carboidratos
→↑	3. Gordura
→↑	4. Proteína
→↑	5. Cafeína
↓↑	6. Álcool
↓↑	7. Hora da refeição
↑	8. Desidratação
?	9. Microbiota

	MEDICAMENTOS
→↓	10. Dose dos medicamentos
↓↑	11. Horário dos medicamentos
↓↑	12. Interação medicamentosa
↑↑	13. Corticóides
↑	14. Niacina (Vitamina B3)

	AMBIENTE
↑	33. Insulina vencida
↑	34. Inacurácia da medida de glicose
↓↑	35. Temperatura ambiente
↑	36. Queimadura de sol
?	37. Altitude

	BIOLÓGICO
↑↑	15. Sono insuficiente
↑	16. Estresse e dias de doença
→↓	17. Hipoglicemia recente
↑	18. Glicose noturna
↑	19. Fenômeno do alvorecer
↑	20. Problemas do conjunto de infusão
↑	21. Tecido cicatricial e lipodistrofia
↓↓	22. Aplicação intramuscular de insulina
↑	23. Alergias
↑	24. Glicemias muito elevadas
↓↑	25. Período pré-menstrual
↑↑	26. Puberdade
↓	27. Doença celíaca
↑	28. Cigarro

	COMPORTAMENTAL & DECISÕES
↓	29. Frequência de medidas de glicose
↓↑	30. Padrão de opções e escolhas
↓↑	31. Decisões baseadas em crenças
↓↑	32. Relacionamento familiar e pressões sociais

	ATIVIDADES
→↓	38. Exercícios leves
↓↑	39. Exercícios de moderada e alta intensidade
→↓	40. Nível musculação
↓↑	41. Hora do dia
↓↑	42. Alimentos e tempo de ação insulina

Contamos com a colaboração das escolas e dos profissionais da saúde dos nossos municípios!

E escola tem o dever de receber todos e não tem o direito de negar matrícula para um aluno só por ter diabetes!

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART. Nº 205 E 206 (P.77) E 227 (P.83)
- ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069, 13 DE JULHO DE 1990 ART. Nº 4, 5 (P.1 1), 53 E 54 (P.21)
- LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL LEI Nº 9.394, 20 DE DEZEMBRO DE 1996 ART. Nº 3,4 E 5 (P.8) E 7 (P.9)
- CÓDIGO CÍVIL LEI Nº 10.406, 10 DE JANEIRO 2002 ART. Nº 186 (P.31), 187 (P.32) E 927 (P.74)

O aluno tem o direito de ter sempre em mão seu Kit diabetes, de medir, corrigir com insulina ou alimento, sempre que necessário

- ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069, 13 DE JULHO DE 1990 ART. Nº 54 (P.21), 70 (P.22) E 71 (P.23)
- LEI FEDERAL Nº 11.347, 27 DE SETEMBRO DE 2006 ART. Nº 1 E 3 (P.1)
- RIO GRANDE DO SUL Portaria NNº74, de 27/12/2002

EU TENHO DIABETES TIPO 1

aadirs

Associação de Apoio
aos Diabéticos do RS

Nome: _____

Telefone: _____

Em caso de urgência, avisar: _____

Contato: _____

Se o meu comportamento for anormal, tremor, palidez, transpiração, convulsão ou perda de consciência, peço o favor de tomarem as seguintes providências:

- Dar-me água com açúcar ou outra bebida açucarada;
- Se estiver desmaiado, colocar uma colher de sopa de açúcar entre a bochecha e os dentes;
- Se não melhorar, chamar SAMU (192) ou levar-me a um pronto socorro.

Obrigada!

Onde me encontrar?

WhatsApp: 51998160539

Facebook: @gabi.feiden

Instagram @gabi.feiden

Por email: gfeiden@gmail.com

Onde nos encontrar?

Facebook: @AadirsAssociacao

Instagram @associacaoaadirs

Por email: associacaoaadirs@gmail.com

Site: <http://aadirs.org.br>